

RESONANCIA MAGNÉTICA

ENTERORESONANCIA

CON CONTRASTE (INTESTINO DELGADO)



- **Referencia médica.**
- **6 horas de ayuno.**
- **Resultado de pruebas de función renal** (máximo un mes de antigüedad).
- **Tomar una Buscapina 40 minutos antes del estudio, o presentarse 40 minutos antes para que le coloquen el medicamento** (es para reducir los movimientos intestinales).
Disolver 4 sobres de Magic Lax en 1 litro de agua y dividirlo en 3 tomas: 1 hora antes del estudio, 40 minutos antes del estudio y 20 minutos antes del estudio.
- **Presentarse 30 minutos antes de la cita.**
- **No tener objetos metálicos** en el área donde se va a realizar la resonancia. *Ejemplo: si la resonancia es de cerebro o cuello y el paciente tiene brackets debe primero ir a retirarselos con su ortodoncista.*
- **Si tiene marcapasos ó stent debe ser compatible con la resonancia** y debe coordinar con la empresa de su dispositivo para la configuración posterior.
- **No tener tatuajes con tinta plomada**, puede inflamarse el área o una quemadura.



HOSPITAL
METROPOLITANO[®]
LA MEJOR MEDICINA A SU ALCANCE.

Si tiene dudas o consultas por favor comunicarse al:



7036-3548



radiologia.lindora@metropolitanocr.com